

SVT	Thème 2A – De la plante sauvage à la plante domestiquée	Term Spécialité
Activité	Chapitre 3 : Reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité	ESTHER

Activité : La pollinisation chez le Tournesol - [modifié depuis Polynésie – BAC2024]

Le Tournesol (*Helianthus annuus*) est l'un des principaux oléagineux (plantes cultivées pour leurs graines riches en matières grasses) cultivés dans le monde, notamment pour son intérêt économique et ses débouchés variés : production d'huile de Tournesol pour l'alimentation humaine, production de tourteaux (résidus obtenus après l'extraction d'huile) pour l'alimentation animale (bovins, volailles, lapins).

Alors que certaines variétés cultivées de Tournesol sont capables d'autofécondation, l'espèce sauvage dont elles sont issues est strictement allogame (pollinisation croisée obligatoire).


Expliquez les éléments favorisant la fécondation croisée chez le Tournesol, puis montrer en quoi elle est plus avantageuse que l'autofécondation. Discuter ensuite de l'intérêt pour les producteurs de Tournesol d'implanter des ruches dans leurs parcelles.

Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix intégrant des données des documents et les connaissances utiles.


Document 1 : Le capitule de Tournesol (*Helianthus annuus*)


Document 1a : Capitule d'*Helianthus annuus*

Le capitule est composé d'une rangée de fleurs stériles située en périphérie, et de fleurs fertiles nommées fleurons. Les fleurons fleurissent progressivement de la périphérie vers le centre. Chaque fleuron est hermaphrodite : il présente les pièces mâles (fillet et anthères formant les étamines) et femelles (ovaire, style, stigmate) ainsi que des nectaires, glandes produisant du nectar. Les boutons floraux situés au centre du capitule correspondent au stade de développement du fleuron avant la floraison.



Document 1b : Dynamique de floraison chez le Tournesol





Ce sont d'abord les parties mâles des fleurons qui fleurissent : lorsque les fleurons s'ouvrent, les anthères apparaissent rendant le pollen accessible. Il peut alors être récupéré par des butineurs. Le jour suivant, le fleuron se transforme et ce sont les organes femelles qui se développent. Deux stigmates apparaissent au centre du fleuron, ils se séparent et s'enroulent sur eux-mêmes. Cet enroulement positionne les grains de pollen de telle manière que la probabilité d'une autopolinisation au sein de la même fleur est considérablement limitée.


La face externe des stigmates est recouverte par des poils gluants qui piègent les grains de pollen issus du même fleuron lors de l'enroulement des stigmates.

Seule la face interne de chaque stigmate, qui possède des papilles gluantes, est réceptive au pollen.

Document 2 : Structure du grain de pollen et réceptivité des stigmates

Le pollen de Tournesol est constitué par des grains collants et ornementés d'épines sur toute leur surface, facilitant l'accrochage aux pollinisateurs. Relativement lourds, ils sont difficilement transportables par le vent.

Source : <http://www.svtaclairji.fr/coevolution/tournesol/fleurs.htm>



Document 3 : Effet des insectes pollinisateurs et des méthodes de pollinisation sur la production de semences (akènes) chez le Tournesol

Le fruit du Tournesol est appelé akène: c'est une graine entourée d'une coque. Des expérimentations de pollinisation sont réalisées dans différentes conditions. Pour chaque condition expérimentale, le pourcentage moyen d'akènes par capitule est calculé par rapport au témoin (pollinisation libre en pots).

Méthode de pollinisation	Conditions expérimentales	% moyen d'akènes
POLLINISATION EN CAGE tournesols cultivés en pots dans des cages de pollinisation en présence d'une espèce d'insecte pollinisateur	Abeille (<i>Apis mellifera</i>)	87,9
	Bourdon (<i>Bombus terrestris</i>)	105,7
	Mégachile (<i>Megachile rotundata</i>)	77,1
	Mouche (<i>Calliphora spp</i>)	72,9
POLLINISATION LIBRE	Culture en plein champ : tournesols accessibles à tous les insectes pollinisateurs présents	156,8
	TÉMOIN – Culture en pots : tournesols accessibles à tous les insectes pollinisateurs présents	100
POLLINISATION MANUELLE	Culture en plein champ. Pollinisation réalisée manuellement par du personnel (autofécondation)	35,9

Remarque : l'emploi du Bourdon dans les cultures est coûteux, son élevage n'étant pas complètement maîtrisé.

Source : modifié d'après Efficacité comparée de la pollinisation d'espèces sauvages d'*Helianthus* par plusieurs genres d'insectes.
S. Meynié, R. Bernard.

Document 4 : Pourcentages d'akènes de tournesols vides selon la distance des plantations de tournesols par rapport aux ruches


En absence de fécondation, les akènes se forment mais demeurent vides et ne contiennent pas de graines.

Distance des plantations de tournesols par rapport aux ruches (en mètres)	400	600	1 070	1 600
Akènes vides (en %)	7,7	14,4	20	31,1

Observations réalisées dans la région de Kharkov (actuelle Ukraine), publiées en 1955 par Glukov.

Source : Observations sur la pollinisation du Tournesol – Jacques LECOMTE, 1962

Nombre de capitules




Document 5 : Effet des visites des abeilles sur la teneur en matière grasse des graines de tournesols

Ab. : plantes visitées par les abeilles

T : témoin

Document 6 : Un des mécanismes pouvant empêcher l'autofécondation



Les plantes disposent de deux allèles du gène S, gène impliqué dans les mécanismes de l'auto-incompatibilité (Exemple: S1 et S3 pour la plante A). Le pollen haploïde produit par la plante ne contient qu'un seul allèle alors que les cellules du style et de l'ovaire sont diploïdes. Une germination du grain de pollen aboutissant à une fécondation de l'ovule ne sera possible que si le grain de pollen porte un allèle différent des allèles de l'ovaire. **Une croix indique un arrêt de la germination du grain de pollen.**

Site : <https://svtaumicro.fr/>